



Многоцентровое наблюдательное клиническое исследование динамики микросателлитной нестабильности и молекулярно-генетического профиля колоректального рака в ходе иммунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа.

Необходимый материал:

- ▶ Микробиота (только для пациентов с КРР)
- ▶ FFPE блоки (первичная опухоль и/или материал метастаза)
- ▶ Кровь

Забор крови:

- ▶ Пробы предоставляет ОнкоАтлас.
- ▶ 2 пробирки (8-10 мл) перед началом лечения иммунотерапией
- ▶ 1 пробирка на 14 день после начала терапии
- ▶ 2 пробирки на 28 день после начала терапии
- ▶ По 1 пробирке во время каждого контрольного обследования
- ▶ 1 пробирка в течение 7 дней после отмены препарата

Сроки передачи материала:

- ▶ Кровь – в течение 4 дней после забора
- ▶ FFPE – по мере возможности после включения пациента



КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ:

- ▶ Верифицированный диагноз;
- ▶ Наличие статуса микросателлитной нестабильности, определенному по опухолевому материалу методом ИГХ, ПЦР с фрагментным анализом или NGS;
- ▶ Пациент еще не получает иммунотерапию;
- ▶ Пациент начнет получать иммунотерапию в течение ближайших двух недель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ▶ Исследование проводится с помощью NGS. Помимо MSI анализируется 38 основных онкогенов
- ▶ По результатам тестирования опухолевого материала предоставляется заключение;
- ▶ Врачу предоставляется полная молекулярно-генетическая информация
- ▶ Исследование проводится на условиях соавторства в научных публикациях
- ▶ Опухолевый материал возвращается в течении 3-х месяцев или по запросу

Координаторы исследования:

+7 909 677 52 74 – Максим Иванов
+7 915 417 36 77 – Александра Лебедева

Для передачи материала (курьер):

+7 988 386 47 45 – Саида Алиярова



шаблон
направления



протокол
сбора крови



информированное
согласие